

สิงโตพัดแดง

Cirrhopetalum lepidum (Blume) Schltr.



ชื่อไทย สิงโตพัดแดง

ลักษณะ กอกล้วยไม้ขนาดค่อนข้างเล็ก หัวรูปไข่ ขนาด 1.5-2.5 x 1-1.5 ซม. เรียงตัวห่างกัน 2-4 ซม. บนเหง้า แผ่ไปบนเปลือกไม้ ใบเป็นรูปแถบหรือรูปใบหอกกลับ ขนาด 10-15 x 1.4-1.8 ซม. แผ่นใบค่อนข้างหนา และเหนียว ข้อดอกยาวใกล้เคียงกับใบ ก้านช่อพอม แต่เหนียว ปลายสุดมีดอก 7-10 ดอก เรียงตัวแผ่แบนในแนวรัศมี เป็นรูปใกล้เคียงกับครึ่งวงกลมหรือรูปพัด 1.5-2 x 0.5-0.7 ซม. กอกล้วยไม้ชนิดนี้ปลูกเลี้ยงให้ดอกได้ตามฤดูกาล

เขตการกระจายพันธุ์ เอเชียตอนใต้

ประเทศไทยพบที่ พบทั่วไปตามป่าดิบเกือบทุกภาค

ถิ่นอาศัย -

ฤดูออกดอก เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ, แยกกล้า

อ้างอิง : รองศาสตราจารย์ ดร.อบฉันท์ ไทยทอง “กล้วยไม้เมืองไทย” พิมพ์ครั้งที่ 14 - มีนาคม 2551 หน้า 148.