

เอื้องกุหลาบกระเป๋้าปิด

Aerides odorata Lour.



ชื่อไทย เอื้องกุหลาบกระเป๋้าปิด เอื้องกุหลาบขาว เอื้องพวงกุหลาบ เอื้องกุหลาบเดือยไก่อ เอื้องเป็ดน้อย ม้าหมุย

ลักษณะ ต้นขึ้นตั้งตรงหรือเอน หรือห้อยลง ยาว 20-70 ซม. ใบขนาด 12-15 x 2 ซม. แผ่นใบค่อนข้างหนา

และเหนียว พับเป็นรางตามยาว เรียงตัวซ้อนถี่ ผิวใบแห้ง ช่อดอกเอนในแนวระนาบหรือห้อยลงเล็กน้อย ยาวใกล้เคียงกับความยาวของใบ ดอกในช่อมีจำนวนมาก ขนาดดอก 2-2.5 ซม. กลีบค่อนข้างอวบ กลิ่นหอมฟุ้งกระจายเช่นเดียวกับกุหลาบกระเป๋้าเปิด บานทนหลายวัน ปลุกเลี้ยงให้ดอกได้ง่ายตามฤดูกาล

เขตการกระจายพันธุ์ อินเดีย เนปาล ภูฏาน พม่า อินโดจีน และภูมิภาคมาเลเซีย

ประเทศไทยพบที่ พบตามป่าดิบเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงใต้

ถิ่นอาศัย -

ฤดูออกดอก เดือนเมษายน – พฤษภาคม

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ, แยกหน่อ และตัดยอดมีรากติดไปด้วย 2-3 ราก