

# เอื้องผึ้ง

## *Dendrobium lindleyi* Steud



**ชื่อพ้อง** *Dendrobium aggregatum* Roxb.

พบครั้งแรกทางภาคเหนือของประเทศพม่า ในปี ค.ศ.1840 Ernst Gottlieb von Steudel ได้ตั้งชื่อพฤกษศาสตร์ “D. lindleyi” โดยชื่อระบุชนิดตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ Sir John Lindley

**ลักษณะ** ลำลูกกล้วยรูปรีอ้วนสั้นและขึ้นชิดเป็นกอ ปลายลำมี 1 ใบ รูปรี รูปรีแกมรูปขอบขนานจนถึงรูปทรงเกือบกลม ขนาด 3 x 6 ซม. ปลายใบเว้า แผ่นใบหนาและแข็ง ใบมีอายุหลายฤดู ช่อดอกมี 1 – 2 ช่อ ห้อยลง ก้านช่อดอกยาวกว่าแกนช่อดอก ดอกสีเหลืองเข้ม ขนาด 2 ซม. กลีบเลี้ยงรูปรีแกมรูปไข่ กลีบดอกรูปทรงเกือบกลม ปลายกลีบมน กลีบปากรูปทรงเกือบกลม โคนกลีบสีเข้ม เส้นแวงสีน้ำตาล มีฝากรอบกลุ่มเรณูรูปกลม

**เขตการกระจายพันธุ์** สิกิมิ ภูฏาน อินเดีย จีน พม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา

**ประเทศไทยพบที่** เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก พิษณุโลก เลย ชัยภูมิ จันทบุรี ตราด ชลบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา

**ถิ่นอาศัย** กล้วยไม้อิงอาศัย พบในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ตามที่โล่งแจ้ง แสงแดดจัด ในหลายระดับความสูง

**ฤดูออกดอก** เดือนมีนาคมถึงเมษายน ช่วงออกดอกไม่ทิ้งใบ ดอกมีกลิ่นหอม

**การขยายพันธุ์** เพาะเมล็ด, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ, แยกหน่อ