

เอื้องเข็มแดง

Ascocentrum curvifolium (Lindl.) Schltr.



ชื่อไทย เอื้องเข็มแดง เอื้องม้าดำ

ลักษณะ ต้นก่อนข้างพอม ยาว 10-20 ซม. ขึ้นตรงหรือเอน โค้งลง ใบขนาด 12-20 x 1.2 ซม.

แผ่นใบค่อนข้างหนา โค้งหรือบิดเล็กน้อย ผิวใบมัน ช่อดอกตั้ง ยาวใกล้เคียงกับใบ ดอกในช่อค่อนข้างโปร่ง ขนาดดอก 1.5 – 2 ซม. กลีบปากรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 4 มม. ปลายหยักเว้าคี่

เขตการกระจายพันธุ์ อินเดียตอนเหนือ ศรีลังกา พม่า และลาว

ประเทศไทยพบที่ พบตามป่าดิบแล้งหรือป่าเบญจพรรณในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคตะวันตก

ถิ่นอาศัย -

ฤดูออกดอก เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ, แยกหน่อ และตัดยอดมีรากติดไปด้วย 2-3 ราก